

## Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, des Apothekers oder des Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

## Alcacyl® Tabletten

### Was ist Alcacyl und wann wird es angewendet?

Alcacyl enthält den Wirkstoff Acetylsalicylsäure. Dieser wirkt schmerzlindernd und fiebersenkend.

- Alcacyl wird angewendet zur kurzfristigen Behandlung von leichten bis mässig starken, akuten Schmerzen (Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Schmerzen im Bereich von Gelenken und Bändern, Rückenschmerzen).
- Zur symptomatischen Behandlung von Fieber und/oder Schmerzen bei Erkältungskrankheiten. Kinder und Jugendliche nur nach ärztlicher Verschreibung und nur als Mittel der zweiten Wahl (siehe „Wann ist bei der Einnahme von Alcacyl Vorsicht geboten?“).

### Was sollte dazu beachtet werden?

Wie alle Fieber- oder Schmerzmittel soll auch Alcacyl nicht ohne Verordnung des Arztes oder der Ärztin länger als 5 Tage oder bei Fieber länger als 3 Tage angewendet werden. Schmerzmittel sollen ohne ärztliche Kontrolle nicht über längere Zeit regelmässig eingenommen werden. Länger andauernde Schmerzen bedürfen einer ärztlichen Abklärung. Die langfristige Einnahme von Schmerz- und Fiebermitteln, insbesondere bei Präparaten, welche mehrere schmerzstillende Wirkstoffe enthalten, kann zu dauerhafter Nierenschädigung mit dem Risiko eines Nierenversagens führen. Die angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung darf nicht überschritten werden. Die lang dauernde Einnahme von Schmerzmitteln kann dazu beitragen, dass Kopfschmerzen weiter bestehen.

### Wann darf Alcacyl nicht angewendet werden?

Alcacyl dürfen Sie in folgenden Fällen nicht anwenden:

- Wenn Sie an einem Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür leiden.
- Wenn Sie an einer krankhaft erhöhten Blutungsneigung leiden.
- Bei Zuständen mit erhöhter Blutungsgefahr (z.B. Monatsblutung oder Verletzungen).
- Wenn Sie überempfindlich sind auf den Wirkstoff Acetylsalicylsäure, andere Entzündungshemmer (Rheumamittel) oder auf andere Schmerz- und Fiebermittel. Eine solche Überempfindlichkeit äussert sich z.B. durch Asthma, Atemnot, Kreislaufbeschwerden, Schwellungen der Haut und Schleimhäute oder Hautausschläge (Nesselfieber).
- Bei schweren Leber- oder Nierenerkrankungen.

### Wann ist bei der Einnahme von Alcacyl Vorsicht geboten?

Bei vorgeschädigter Niere und/oder Leber ist eine sorgfältige Überwachung notwendig. Bei chronischen oder wiederkehrenden Magen-Darm-Beschwerden, Asthma, Nesselfieber, Nasenpolypen, bei einer seltenen erblichen Krankheit der roten Blutkörperchen (dem sogenannten «Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenasemangel») sowie bei der Behandlung mit gerinnungshemmenden Mitteln («Blutverdünner») soll die Einnahme nur nach strengen Anweisungen des Arztes oder der Ärztin erfolgen. Bei Diabetikern soll der Arzt oder die Ärztin während einer hochdosierten Behandlung mit Alcacyl über eine Anpassung der Insulin- oder Antidiabetika-Dosis entscheiden. Kinder und Jugendliche mit Fieber, Grippe, Windpocken oder anderen Virus-Erkrankungen dürfen Alcacyl Tabletten nur nach Anweisung des Arztes bzw. der Ärztin und nur als Mittel der zweiten Wahl einnehmen. Kommt es bei diesen Erkrankungen oder nach ihrem Abklingen zu Bewusstseinsstörungen mit Erbrechen, sollte unverzüglich der Arzt oder die Ärztin konsultiert werden. Bei gleichzeitiger und längerer Anwendung von Alcacyl zusammen mit Kortisonpräparaten, Blutverdünnern, Lithiumpräparaten gegen Depressionen und Tabletten gegen Zuckerkrankheit kann deren Wirkung verstärkt werden. Die Wirkung von Gichtmitteln (Probenecid und Sulfapyrazon) kann vermindert werden. Bei Anwendung von Rheumamitteln oder Methotrexat (das z.B. bei chronischer Polyarthritiden eingenommen wird) ergibt sich eventuell eine Verstärkung der unerwünschten Wirkungen. Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekauft!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Über die Einnahme vor operativen Eingriffen ist der Arzt oder Zahnarzt bzw. die Ärztin oder Zahnärztin zu befragen bzw. zu informieren.

### Darf Alcacyl während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Während der Schwangerschaft und Stillzeit soll die Einnahme nur nach strengen Anweisungen des Arztes oder der Ärztin erfolgen. In den letzten drei Monaten vor dem errechneten Geburtstermin darf Alcacyl nicht eingenommen werden. Während der Stillzeit ist auf hohe Dosen zu verzichten.

### Wie verwenden Sie Alcacyl?

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren und schwerer als 40 kg: Die übliche Einzeldosis sind 1–2 Tabletten, das übliche Dosierungsintervall beträgt 4–8 Stunden. Eine Tagesdosis von 7 Tabletten darf beim Erwachsenen nicht überschritten werden (entsprechen 2,9 g Acetylsalicylsäure). Kinder von 9–12 Jahren (30–40 kg): 1 Tablette 1–3 mal täglich. Kinder von 6–9 Jahren (22–30 kg): 1/2 Tablette 1–5 mal täglich. Für Kinder im Alter von 2–6 Jahren muss ein genau dosierbares Präparat angewendet werden. Das Arzneimittel sollte mit viel Flüssigkeit aufgeschwemmt werden und möglichst nach einer Mahlzeit eingenommen werden. Alcacyl enthält Aluminiumhydroxid und sollte daher mit anderen Arzneimitteln nicht gleichzeitig, sondern im Abstand von etwa 2 Stunden eingenommen werden. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

### Welche Nebenwirkungen kann Alcacyl haben?

Magenbeschwerden; in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen wie Schwellungen der Haut und Schleimhäute oder Hautausschläge oder Asthma, Atemnot sowie Magengeschwüre und Blutungen der

Magenschleimhaut. Treten Zeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion auf, ist das Arzneimittel abzusetzen und der Arzt oder die Ärztin zu konsultieren. Kommt es während der Behandlung zu einer Schwarzfärbung des Stuhls oder zu blutigem Erbrechen, soll das Arzneimittel abgesetzt und unverzüglich der Arzt oder die Ärztin aufgesucht werden. Selten kommt es zu Schwindel, Kopfschmerzen, Sehstörungen und Verwirrheitszuständen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

### Was ist ferner zu beachten?

Alcacyl ist ausser Reichweite von Kindern aufzubewahren! Da Alcacyl Tabletten kein Natrium enthalten, dürfen sie auch von Patienten mit einer salzarmen Diät eingenommen werden. Bitte konsultieren Sie bei unkontrollierter Einnahme (Überdosis) unverzüglich einen Arzt oder eine Ärztin. Ohrensausen und/oder Schwindelattacken können ein Hinweis auf eine Überdosierung sein. Die Packung ist bei Raumtemperatur (15–25 °C) zu lagern und vor Feuchtigkeit zu schützen. Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit EXP bezeichneten Datum verwendet werden. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

### Was ist in Alcacyl enthalten?

1 Tablette enthält als Wirkstoff 528 mg Calciumcarbasalat entsprechend 415 mg Acetylsalicylsäure; Hilfsstoffe.

### Zulassungsnummer 10'368 (Swissmedic)

### Wo erhalten Sie Alcacyl? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung. Packungen zu 20 Tabletten.

### Zulassungsinhaber Häseler AG, CH-9100 Herisau.

Diese Packungsbeilage wurde im März 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

### Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Alcacyl® Comprimés

### Qu'est-ce que Alcacyl et quand est-il utilisé?

Alcacyl contient comme substance active l'acide acétylsalicylique qui calme les douleurs et abaisse la fièvre.

- Alcacyl est utilisé pour le traitement à court terme de douleurs légères à modérément fortes, de douleurs aiguës (maux de tête, maux de dents, douleurs au niveau des articulations et des ligaments, maux de dos).
- Dans le traitement symptomatique de la fièvre et/ou des douleurs des maladies causées par un refroidissement. Utilisation chez les enfants et les adolescents uniquement sur prescription médicale et comme médicament de deuxième choix (cf. „Quelles sont les précautions à observer lors de la prise d'Alcacyl?“).

### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Comme tous les antipyrétiques et analgésiques, Alcacyl ne devrait pas être pris pendant plus de 5 jours ou plus de 3 jours en cas de fièvre, sans prescription du médecin. Les analgésiques ne doivent pas être pris régulièrement pendant une période prolongée sans contrôle médical. En cas de douleurs persistantes, veuillez consulter un médecin. L'absorption prolongée d'analgésiques et d'antipyrétiques, en particulier le combinaison de plusieurs substances analgésiques, peut provoquer des troubles durables de la fonction rénale avec un risque de défaillance rénale. Le dosage indiqué ou prescrit par le médecin ne doit pas être dépassé. L'absorption prolongée d'analgésiques peut contribuer à faire persister les maux de tête.

### Quand Alcacyl ne doit-il pas être utilisé?

Alcacyl ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes:

- Si vous souffrez d'un ulcère à l'estomac ou au duodénum.
- Si vous avez une disposition hémorragique pathologique.
- Dans les états s'accompagnant d'un risque accru d'hémorragie (par exemple, règles ou blessures).
- Si vous présentez une hypersensibilité au principe actif acide acétylsalicylique ou à d'autres anti-inflammatoires (antirhumatismaux) ou analgésiques et antipyrétiques. Une telle hypersensibilité se manifeste par des signes tels que: asthme, détresse respiratoire, troubles circulatoires, tuméfactions de la peau et des muqueuses ou éruption cutanée (urticaire).
- En cas de troubles graves du foie ou des reins.

### Quelles sont les précautions à observer lors de la prise d'Alcacyl?

En cas de troubles connus de la fonction hépatique ou rénale, le patient devra être suivi de près. En cas de troubles gastriques et intestinaux chroniques ou récidivants, d'asthme, d'urticaire, de polypes nasaux, de déficit en «glucose-6-phosphate-déshydrogénase», une maladie héréditaire rare des globules rouges, ainsi qu'en cas de traitement concomitant aux anticoagulants, le médicament ne sera pris que sous le contrôle strict du médecin. En cas de diabète et lors d'un traitement à l'Alcacyl à doses élevées, le médecin devra envisager un ajustement de la posologie de l'insuline ou des antidiabétiques. Les enfants et les adolescents atteints de fièvre, de grippe, de varicelle ou d'autres affections virales ne peuvent prendre les comprimés d'Alcacyl que sur prescription médicale et comme médicament de deuxième choix. Si lors ou après l'affaiblissement de telles maladies, le patient présente des troubles de la conscience accompagnés de vomissements, le médecin sera consulté sans tarder. L'utilisation concomitante et prolongée d'Alcacyl peut renforcer l'effet des corticostéroïdes, des anticoagulants, des antidépresseurs au lithium et des comprimés contre le diabète. L'effet des remèdes contre la goutte (probenécide et sulfapyrazone) peut être diminué. En cas d'utilisation concomitante d'antirhumatismaux ou de méthotrexate (administré par exemple en cas de polyarthrite chronique) il se peut que les effets indésirables soient renforcés. Veuillez

informare il medico, il farmacista o il vostro farmacista

- se soffrite di una malattia,
- se siete allergici,
- se prendete o avete già usato altri medicinali (anche auto-medicazione!).

Il medico o il dentista deve essere consultato o informato della presa di Alcacyl prima di qualsiasi intervento chirurgico.

### Alcacyl può essere preso durante la gravidanza o l'allattamento?

Alcacyl non deve essere assunto durante la gravidanza e l'allattamento senza controllo medico. Il medicinale non deve essere usato nei tre ultimi mesi della gravidanza. Si deve rinunciare a un dosaggio importante di Alcacyl durante l'allattamento.

### Comment utiliser Alcacyl?

Adultes et enfants à partir de 12 ans et pesant plus de 40 kg: La dose unitaire est de 1 à 2 comprimés, l'intervalle entre les prises de 4 à 8 heures. Une dose journalière de 7 comprimés ne doit pas être dépassée chez l'adulte (l'équivalent de 2,9 g d'acide acétylsalicylique). Enfants de 9-12 ans (30-40 kg): 1 comprimé 1 à 3 fois par jour. Enfants de 6-9 ans (22-30 kg): 1/2 comprimé 1 à 5 fois par jour.

Pour les enfants âgés de 2 à 6 ans on devra recourir à une préparation pouvant être dosée exactement. Il est conseillé de délayer les comprimés dans un grand verre d'eau ou autre boisson et de les prendre si possible après un repas. Alcacyl contient de l'hydroxyde d'aluminium et ne devrait de ce fait pas être pris en même temps que d'autres médicaments, mais avec un intervalle de deux heures. Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

### Quels effets secondaires Alcacyl peut-il provoquer?

Des troubles gastriques; dans de rares cas des réactions d'hypersensibilité telles que tumeurs de la peau et des muqueuses, éruptions cutanées, asthme, détresse respiratoire, ulcères gastriques et saignements de la muqueuse gastrique. Dès l'apparition de signes d'une réaction d'hypersensibilité, la prise du médicament doit être interrompue et un médecin doit être consulté. Si les selles adoptent une coloration noire en cours de traitement ou si le patient vomit du sang, la prise du médicament doit être immédiatement interrompue et un médecin doit être consulté. Des étourdissements, maux de tête, troubles visuels ou états de confusion ont été observés dans de rares cas. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### A quoi faut-il encore faire attention?

Alcacyl doit être tenu hors de portée des enfants. Alcacyl Comprimés ne contenant pas de sodium, le produit peut être utilisé en cas de régime pauvre en sel. En cas de prise non contrôlée (surdosage), consultez immédiatement un médecin. Le bourdonnement d'oreilles et/ou une transpiration abondante peuvent être révélateurs d'un surdosage. Conserver l'emballage à température ambiante (15-25 °C) et à l'abri de l'humidité. Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

### Que contient Alcacyl?

1 comprimé contient comme principe actif 528 mg de carbasalate de calcium correspondant à 415 mg d'acide acétylsalicylique; excipients.

Número d'autorisation 10'368 (Swissmedic)

### Où obtenez-vous Alcacyl? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale. Emballages de 20 comprimés.

Titulaire de l'autorisation Häseler AG, CH-9100 Herisau.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2009 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

### Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicinale le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicinale conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

## Alcacyl® Compresse

### Che cos'è Alcacyl e quando lo si usa?

Alcacyl contiene la sostanza attiva acido acetilsalicylico che ha un effetto analgesico e abbassa la febbre.

- Alcacyl si usa per il trattamento a breve termine di dolori acuti di intensità da lieve a moderata (mal di testa, mal di denti, dolori a livello articolare e tendineo, mal di schiena).
- Per il trattamento sintomatico di febbre e/o dolori in caso di malattie da raffreddamento. Nei bambini e ragazzi esclusivamente su prescrizione medica e solo come rimedio di seconda scelta (vedere «Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Alcacyl?»).

### Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Come tutti i farmaci antipiretici e analgesici, Alcacyl senza prescrizione medica non dovrebbe essere assunto per più di 5 giorni o in caso di febbre per oltre 3 giorni. Gli analgesici non devono essere assunti regolarmente per periodi più lunghi senza controllo da parte del medico. I dolori persistenti necessitano di un accertamento medico. La prolungata assunzione di antipiretici e analgesici, in particolare per i preparati che contengono diverse sostanze analgesiche, può causare danni permanenti ai reni, con il rischio di un blocco renale. Il dosaggio indicato o prescritto dal medico non deve essere superato. Va anche considerato

che l'uso prolungato di antidolorifici può contribuire alla ricomparsa del mal di testa.

### Quando non si può assumere Alcacyl?

Alcacyl non dev'essere assunto in seguenti casi:

- Se soffre di ulcera allo stomaco o al duodeno.
- Se mostra una predisposizione patologica all'emorragia.
- In casi di particolare rischio di emorragia (per esempio mestruazioni, o ferite).
- Se presenta un'accentata ipersensibilità verso l'acido acetilsalicylico, altri antinfiammatori (antireumatici) o altri analgesici o antipiretici. Una tale ipersensibilità si manifesta attraverso asma, difficoltà di respirazione, problemi alla circolazione, tumefazioni della pelle o delle mucose ed eritema (orticaria).
- In caso di gravi malattie epatiche o renali.

### Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Alcacyl?

Nel caso in cui i reni o il fegato presentino delle patologie, è necessario un controllo accurato. In caso di problemi cronici o ricorrenti allo stomaco e all'intestino, asma, orticaria, polipi nasali, in caso di una rara malattia ereditaria dei globuli rossi (la cosiddetta «carezza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi»), nonché in caso di trattamento concomitante a base di anticoagulanti («emodiluenti»), l'assunzione può avvenire solo dietro stretta prescrizione medica. Per i pazienti diabetici, in caso di trattamento con Alcacyl ad alto dosaggio, il medico dovrà stabilire un adeguamento della dose di insulina o di farmaci antidiabetici. I bambini e i ragazzi con febbre, influenza, varicella o altre malattie virali possono prendere Alcacyl Compresse esclusivamente su prescrizione medica e solo come rimedio di seconda scelta. Se queste malattie anche durante il loro termine dovessero comportare una perdita di coscienza con sforzi di vomito, è opportuno consultare immediatamente il medico curante. In caso di contemporanea o prolungata somministrazione dell'Alcacyl insieme a farmaci contenenti cortisone, emodiluenti, farmaci antidepressivi a base di litio e compresse per il diabete, il loro effetto può risultare maggiorato. L'effetto di farmaci per il trattamento della gotta (probenecid e sulfipirazione) può subire un'attenuazione. In caso di somministrazione di farmaci antireumatici o metotrexato (che viene per esempio assunto per la cura di poliartriti croniche) può manifestarsi un aumento degli effetti collaterali.

Informi il suo medico, il suo farmacista o droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica (esternamente) altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Consultare o informare il medico o il dentista dell'assunzione del farmaco prima di sottoporsi a un'operazione.

### Si può somministrare Alcacyl durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza e l'allattamento la somministrazione deve avvenire solo su precisa indicazione del medico. Alcacyl non dev'essere assunto negli ultimi tre mesi di gravidanza. Durante l'allattamento vanno evitate dosi forti.

### Come usare Alcacyl?

Adulti e bambini sopra i 12 anni e di peso superiore ai 40 kg: La dose singola è da 1 a 2 compresse, l'intervallo fra le prese da 4 a 8 ore. Gli adulti non devono superare la dose di 7 compresse al giorno ( corrisp. a 2,9 g d'acido acetilsalicylico). Bambini da 9-12 anni (30-40 kg): 1 compressa 1-3 volte al giorno. Bambini da 6-9 anni (22-30 kg): 1/2 compressa 1-5 volte al giorno.

Per i bambini dai 2 ai 6 anni si deve ricorrere ad una preparazione che si possa dosare esattamente. Si consiglia di ingerire le compresse disciolte in un grande bicchiere d'acqua o altra bevanda, possibilmente dopo i pasti. Alcacyl contiene idrossido di alluminio e pertanto non dovrebbe essere assunto contemporaneamente con altri farmaci, bensì a distanza di circa 2 ore. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

### Quali effetti collaterali può avere Alcacyl?

Disturbi allo stomaco; in casi isolati reazioni di ipersensibilità al prodotto come tumefazioni della pelle e delle mucose o eritemi, asma, difficoltà di respirazione, nonché ulcera gastrica o emorragia della mucosa dello stomaco. All'insorgere di segni di ipersensibilità, sospendere la somministrazione del farmaco e consultare il medico. Se durante il trattamento si notasse una colorazione nerastra delle feci o vomito contenente sangue, è opportuno sospendere la somministrazione del farmaco e consultare immediatamente il medico. Raramente possono manifestarsi capogiri, mal di testa, disturbi alla vista o stati confusionali. Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

### Di che altro occorre tener conto?

Alcacyl dev'essere conservato fuori dalla portata dei bambini. Alcacyl Compresse non contiene sodio, per cui può essere assunto anche da pazienti che seguono una dieta a basso contenuto di sale. Consultare immediatamente il medico in caso di assunzione incontrollata (sovradosaggio). Ronzio auricolare o sudorazione improvvisa possono essere segni di sovradosaggio. Proteggere dall'umidità e conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione dettagliata possono darle ulteriori informazioni.

### Che cosa contiene Alcacyl?

1 compressa contiene come principio attivo 528 mg di carbasalato di calcio corrispondente a 415 mg di acido acetilsalicylico, eccipienti.

Numero dell'omologazione 10'368 (Swissmedic)

### Dov'è ottenibile Alcacyl? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica. Confezioni da 20 compresse

Titolare dell'omologazione Häseler AG, CH-9100 Herisau.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).